



JOUPCHA

le **JOU**rnal de
votre **Pharma-**
cien à la
Pharmacie du
CHâteau à
Beaumont sur
Oise.



Vitrine Tableau %Le Puzzle+d'Elise et Grégory

Nos horaires : Lundi : 14h30-19h15
Mardi : 9h - 12h15 14h30-19h15
Mercredi : 9h - 12h15 14h30-19h15
Jeudi : 9h - 12h15 14h30-19h15
Vendredi : 9h - 12h15 14h30-19h15
Samedi : 9h - 12h15 14h30-18h30

Fermé le Dimanche.

Tél : 01 34 70 00 32 et 01 78 86 17 33.

Faxez vos ordonnances au 01 34 70 02 63.

La pharmacie vous souhaite une bonne journée.

N°5-20 mai 2011

A/ Sièges auto pour enfants Que choisir 483 - juil août 2010 + internet www.tc.gc.ca (transport routier canadien).

Un choc à 50 km/h équivaut pour un enfant à une chute du 3^e étage. Selon la sécurité routière, plus de 60% des parents attachent leur enfant dans un siège inadapté à l'âge ou appliquent mal les consignes d'utilisation. Plusieurs précautions :

- 1/ **toujours utiliser la notice** (bien la conserver) car chaque siège est spécifique et même des experts se trompent.
 - 2/ **toujours attacher les enfants**, quelque soit la distance.
 - 3/ **lors de l'achat, DEMANDEZ** une démonstration d'utilisation et n'achetez que des sièges homologués R44-04 (vérifiez s'il existe une nouvelle norme sur internet avant l'achat).
 - 4/ **choisissez un siège adapté à la morphologie de l'enfant** (surtout pas trop grand, histoire de gagner quelques années avant l'achat suivant). Le passage des sièges 0+ et 0+/1 au groupe supérieur est impératif dès que la tête de l'enfant commence à dépasser du volume de protection de la coque.
 - 5/ **Pour les sièges des groupes 1/2/3, les réhausseurs sans dossier sont déconseillés** car ils ne protègent pas en latéral, ni en cas de choc arrière, en outre, la ceinture de sécurité n'est pas guidée sur l'épaule de l'enfant (risque de cisaillement du cou).
 - 6/ **Evitez les matériels d'occasion**, un choc antérieur peut avoir endommagé le siège, sans laisser de traces visibles à l'extérieur. A moins que vous ne connaissiez bien le vendeur (pour qu'il ne mente pas sur des chocs antérieurs), que vous ayez la notice d'utilisation, que vous ayez bien tous les accessoires, qu'il n'ait jamais servi dans une collision, qu'il n'est pas périmé et ne date pas de plus de 10 ans, qu'il n'ait pas de marques de décoloration (fatigue) ni de fissures et que le harnais n'est ni usé ni déchiré.
 - 7/ **En cas d'achat d'un siège Isofix**, s'assurer que le modèle s'adapte à tous les véhicules.
 - 8/ **Conserver le manuel d'utilisation à portée de main** pour installer correctement le siège.
 - 9/ **S'assurer que le siège est solidement collé à la banquette** (les mouvements avant/arrière et latéraux doivent être minimes).
 - 10/ **Toutes les parties de la ceinture de sécurité doivent être tendues et sans torsion.**
 - 11/ **La distance entre le harnais** (lorsqu'il existe) et l'enfant ne doit pas être supérieure à la largeur de deux doigts.
 - 12/ **Vérifier que la partie ventrale** de la ceinture de sécurité adulte (pour les groupes 2/3) passe bien au niveau des hanches de l'enfant et non de l'abdomen.
 - 13/ **S'assurer régulièrement que l'enfant est bien attaché**, notamment qu'il n'a pas passé les bras en dehors du harnais ou de la ceinture de sécurité. Que la ceinture n'est pas tordue.
 - 14/ **Expliquez à l'enfant que c'est important pour sa sécurité**, le plus souvent possible (pour éviter qu'il ne se détache).
 - 15/ **Vérifiez toujours la température du siège** avant d'y installer l'enfant (risque de brûlure).
 - 16/ **Vérifiez que la ceinture sous-abdominale** (partie sous le ventre) passe bien bas et bien serrée sur les hanches (jamais sur le ventre car il y a risque de blessure grave comme la colonne vertébrale brisée, les organes vitaux internes gravement endommagés -il n'y a pas de os pour absorber la force de l'impact_).
 - 17/ **Placez la ceinture diagonale** au-dessus des épaules et en travers de la poitrine (jamais contre le cou, jamais sous le bras : dans ce dernier cas, en cas de collision, il y aura des blessures graves au cœur, aux poumons...).
- NB : a/ les appuis-têtes doivent être au niveau des oreilles;
b/ au Canada, on recommande que si possible, l'enfant soit à l'arrière jusqu'à 13 ans;
c/ n'attachez jamais deux enfants avec la même ceinture et ne placez jamais la ceinture diagonale derrière le dos de l'enfant.
d/ donnez l'exemple à votre enfant en bouclant toujours votre ceinture.

NB : Au Canada, à titre d'exemple (mais il vaut mieux suivre les recommandations du siège car celles-ci changent souvent).

a/ Nourissons : de la naissance jusqu'à 9kg : siège tourné vers l'arrière, loin des sacs gonflables.

b/ Tout-petits : de 9 à 18 kg : siège tourné vers l'avant, à utiliser avec une sangle.

c/ Age préscolaire jusqu'à 8 ans : siège d'appoint avec les ceintures diagonale et ventrale.

d/ Enfants plus grands : lorsque l'enfant peut s'adosser au siège du véhicule, plier ses genoux confortablement sur le rebord de la banquette, et que la ceinture diagonale repose à plat sur son épaule et sa poitrine, il peut utiliser la ceinture de sécurité du véhicule. La ceinture doit passer sur l'épaule et le milieu de la poitrine de l'enfant (et non sur le cou ou le visage) et que la ceinture sous-abdominale passe sur les hanches (pas sur l'estomac).

B/ Plus d'un million de médicaments contrefaits saisis dans 45 pays, dont la France Le Quotidien du Médecin - 14 octobre 2010, Le Parisien - 2010

L'organisation de police internationale, Interpol, a annoncé la saisie de plus d'un million de médicaments contrefaits après une série de missions menées du 5 au 12 octobre, dans quarante-cinq pays, notamment la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, mais aussi Cuba, la Russie ou la Thaïlande. Le montant de ces saisies est évalué à environ 2,6 millions de \$ (1,86 million d'euros). 290 sites de vente de médicaments contrefaits ont été fermés au terme de cette opération. Il n'y a pas de législation qui criminalise les contrefaçons de médicaments sur Internet. Les produits saisis en France sont essentiellement des spécialités indiquées dans les

troubles de l'érection, mais aussi des produits utilisés pour accroître les performances des sportifs.

C/ Plateforme Cancer info, regroupant 28 associations dont la Ligue nationale contre le cancer, l'Institut national du cancer :
0810 810 821 www.e-cancer.fr/cancer-info

D/ Le secret professionnel, notamment en Pharmacie :

- a/ Code pénal, art 226-13 : il concerne tout le personnel d'une entreprise (notamment de la pharmacie) et toute personne externe effectuant une mission temporaire dans l'entreprise; les sanctions sont de un an de prison et 15 000 euros d'amende.
- b/ Code de la Santé, art R 5015-5 : Tout pharmacien doit veiller à ce que ses collaborateurs soient informés et se conforment au secret professionnel.

E/ On nous parle beaucoup d'assurance maladie privée. Cela marche-t-il mieux ? (Source Conseil de l'Ordre - Bulletin déc. 1998)

- a/ aux Etats-Unis, les coûts administratifs représentent environ 10% des soins contre 4 à 6% en France. Cela a même dû baisser en France depuis la transmission informatique des données administratives.
- b/ en Suisse, dans 8 cantons sur 21, des assurés sociaux ont été privés de leur assurance maladie et ont dû en chercher une autre. En effet, leur assureur a trouvé que, dans ces cantons, les personnes étaient trop âgées et que les assurer n'était plus intéressant.

F/ Analyser un accident du travail : c'est important pour éviter qu'il ne se répète. Seule l'analyse d'un accident met en évidence un défaut d'organisation ou de protection. Une fois identifiée la cause, on peut apporter une solution pour que l'accident ne se répète pas. Chacun, témoins et encadrement, doit répondre du mieux possible à cette enquête, dont le but n'est pas de rechercher un coupable mais la prévention. La solution ne sera pas forcément onéreuse. Il est aussi important d'analyser un simple incident (événement peu grave), car un incident est un accident où on a eu de la chance.

G/ Danger Soleil : il faut se protéger des UV.B mais aussi des UV.A maintenant reconnus des mêmes risques de cancers, de vieillissement de la peau.... La protection nécessite une crème solaire d'indice élevé en quantité suffisante : un adulte d'1m70, de 65 kg devrait utiliser un tube de 100ml de crème solaire en 3 fois. Mais souvent la quantité qu'il met transforme l'indice du tube : par exemple un indice 50 devient un indice 2,7.

H/ Dangers de l'ecstasy : les analyses de différents comprimés montrent des différences importantes en dose et en substances présentes. La dose peut varier de 1 à 20. A côté du MDMA (=ecstasy), on trouve des dérivés et des anabolisants (testostérone...), de l'aspirine, de la caféine, des antipaludéens. Ceci montre qu'on n'est pas à l'abri d'absorber des substances indésirables et toxiques. Certains ne contiennent rien d'actif. On a identifié plus de 250 types différents (la présence d'un logo n'étant pas une assurance). Il a été proposé des réactions chimiques pour identifier les différents types, mais cela ne constitue pas plus une assurance. Sa réputation de faible danger est fautive. On constate d'abord une bouche sèche, une accélération du rythme du cœur, une diminution de l'appétit, une perte brutale de connaissance, des convulsions. Puis fièvre, augmentation de la tension puis chute de tension, rigidité, problème sanguin (coagulation), insuffisance rénale aiguë, perte de sodium, attaques de panique, crises paranoïaques, dépression, suspicion d'infarctus cérébral et d'hémorragie cérébrale. Des décès se sont produits après la prise d'un seul comprimé ou après plusieurs prises sans problème. Après un délai inconnu, des études chez le singe montrent un risque de toxicité pour les nerfs du cerveau. On observe une atteinte du foie allant peu à peu à la cirrhose.

I/ Bricolage et protection : Nous sommes de plus en plus nombreux à bricoler. Les produits utilisés sont de moins en moins toxiques mais de plus en plus nombreux. Pensez à lire toutes les précautions d'emploi sur chaque boîte. Notamment, pensez aux masques et aux gants jetables, disponibles chez nous, à un prix très très intéressant en temps normal et en promotion actuellement.

J/ Vite, vite, vite en voiture : Le saviez-vous, la vitesse moyenne de chaque français sur 1 an est de 30 km/h. Cela veut dire qu'on peut rouler à 120 ou à 150 km/h ponctuellement, mais avec les embouteillages au départ et à l'arrivée, les feux rouges, les stops, les rond-points, la vitesse reste à 29 ou 30 ou 31 km/h. On a roulé très vite mais on a gagné peu de temps (moins de 5 minutes).

Vrai ou Faux : On ne gagne pas de temps en changeant de file de voitures dans un embouteillage.

K/ Le diabète et le pied : 25% des hospitalisations sont dues à un problème de pied (par suite des complications artérielles et nerveuses) : troubles de la cicatrisation, nécroses, diminution des perceptions... Il faut donc surveiller ses pieds. Toute coupure doit être désinfectée et soignée. On ne doit pas soigner soi-même des cors, durillons... Il faut aussi entretenir ses pieds, notamment avec la gamme Alkidia, testée à l'hôpital. Et faire appel à un pédicure spécialisé en diabétologie.

L/ Chaîne du froid en pharmacie : Nous rappelons à notre aimable clientèle que tout produit de la chaîne du froid (vaccins notamment) ne peut être repris dès qu'il quitte la pharmacie, quelle qu'en soit la raison. Cela nous est imposé par les bonnes pratiques de dispensation, parus au Journal Officiel de la République Française. Ceci pour la sécurité de chacun.

M/ Herpès du visage : respect de sa famille, de ses amis, des autres.

L'herpès est un virus : une fois transmis, c'est pour la vie. Si vous en êtes atteint, vous ne devez embrasser personne car vous faites un cadeau empoisonné pour la vie. Si vous contaminez une personne amoindrie (personne âgée ou cancéreuse ou en aplasie ou un bébé...), elle pourra faire une réaction très forte, éventuellement localisée à l'œil (risque de perte de l'œil : c'est une urgence hospitalière). Cela peut devenir très handicapant chez certaines personnes non déficitaires avec éruptions d'herpès à l'année, en continu.

Le respect de l'autre, c'est de ne pas l'embrasser lors des poussées (risque maximum mais le risque de contamination peut exister aussi en-dehors des poussées).

Il existe un produit bien connu, objet de publicités à la télévision mais qu'il convient dans l'idéal de conserver en réserve : on évite ainsi des résistances aux comprimés pour les cas plus graves. Il existe d'autres traitements aussi efficaces.

N/ Refus des génériques : La sécu peut demander un remboursement en cas de refus non justifié. D'autre part, les économies faites éviteront d'autres remboursements notamment à l'hôpital, les baisses d'honoraires de tous les professionnels de santé (ce qui augmentera la pénurie des jeunes qui voudront faire ces métiers : à Beauvais, d'ici 3 ans, 70 spécialistes partent en retraite et ne seront pas remplacés). Et les génériques sont souvent plus performants comme le Zyloric (dont la fabrication date de 30 ans); les progrès permettent d'avoir un générique beaucoup moins agressif pour l'estomac. Alors ne faut-il pas faire un effort ?

O/ Pour rire : Deux sœurs discutent :
- J'ai vu maman hier. Comme elle est maladeö.
- Oui, le médecin m'a dit qu'elle est immunodéprimée.
- Mais non, elle ne fait pas de déprime.

P/ Pour rire :
- ÖVite, vite ...Faites-moi une piqûre anti-britannique, Docteurö
- ÖVous voulez dire anti-tétaniqueö
- ÖNon, non. Je me suis blessé avec une clef anglaise.ö

Votre pharmacien à la pharmacie du Château à Beaumont / Oise et son équipe.